

CRRT SİTRAT ANTİ-KOAGÜLASYON SOLÜSYONU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. 5000 ml'lik steril torbalarda bulunmalıdır.
2. CRRT tedavisi için antikoagülasyon amaçlı kullanılmalıdır.
3. Solüsyon içeriği Sitrata: 10 mmol/L, Sitrik Asit: 2 mmol, Na: 136 mmol/L, Klorid: 106 mmol/L şeklinde olmalıdır.
4. Kalsiyum oranı 0 olan bir steril bikarbonat solüsyonla birlikte kullanılmalıdır.
5. Malzemeyi verecek olan firma ürünlerin steril tarihlerinin bitimine 1 ay kala yeni tarihli ürünler ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.
6. CE belgesine sahip olmalıdır.

Prof.Dr. Seyhan KURŞAT
CBB Tıp Fak. İç Hastalıkları AD
Nefroloji BD
Dip.Tes. No: 36583
Dr. : TC
CBB Tıp Fak. İç Hastalıkları AD
Nefroloji BD
Dip.Tes. No: 36583
Dr. : TC
CBB Tıp Fak. İç Hastalıkları AD
Nefroloji BD
Dip.Tes. No: 36583
Dr. : TC